

ALGEZIOLOGICKÝ CHOROBOPIS – prvé vyšetrenie u pacienta s nádorovou bolesťou

Meno : R.č. :
Adresa : RNP :
Hospitalizovaný / Ambulantný: Zamestnanie :
Odosielajúci lekár: Požiadavka:
Klinická diagnóza :

Anamnéza (TO, OA,RA) :

Doterajšia liečba :

- Chirurgická: radikálna, paliatívna, diagnostická
- Aktinoterapia :
- Chemoterapia :
- Symptomatická :
- Analgetiká (druh a spôsob aplikácie) :
- Adjuvantné lieky :
- Iná (akupunktúra, neurochirurgická, atď.) :

Anamnéza bolesti : PQRST charakteristika bolesti

P	Pain	lokalizácia bolesti	Kde Vás bolí ?
Q	Quality	kvalita bolesti	Aká je to bolesť ?
R	Radiation	vyžarovanie bolesti	Šíri sa niekde ?
S	Severity	intenzita bolesti*	Aká silná je bolesť?
T	Time	časové trvanie	Je bolesť stála alebo sa mení?

Provokujúce faktory

Čo zhoršuje bolesť?

Úľavové faktory

Čo zmierňuje bolesť?

**Na určenie intenzity bolesti sa používajú vizuálne analógové, verbálne a numerické stupnice.*

- Ako vás bolesť obmedzuje ?
- Čo si myslíte o svojej bolesti ?
- Je ešte aj iná bolesť ?

Iné obťažujúce symptómy:

- chuť do jedla jedla
- úbytok hmotnosti
- slabosť
- kvalita spánku
- únava
- nauzea.
- vracanie:
- obštipácia:
- močenie
- dušnosť, kašeľ a podobne
- telesná a duševná aktivita :
- nálada
- záľuby

Čo vie o svojom ochorení ?

Čo očakáva od liečby (plány do budúcnosti) ?

Údaje o chronickej bolesti v minulosti: (lieková či alkoholová závislosť, psychiatrická liečba):

Rozhovor s najbližšími príbuznými :

Celkové fyzikálne vyšetrenie :

váha: výška, BMI, TK: P: Karnofského index, WHO skóre

Hodnotenie telesnej výkonnosti podľa stupnice WHO a Karnofského index

Stupeň (WHO)	Odpovedajúci stav telesnej aktivity	Karnofského index (%)
0	Schopný normálnej telesnej aktivity bez obmedzenia.	90-100
1	Neschopný ťažkej fyzickej námahy, ale môže vykonávať ľahšiu prácu.	70-80
2	Sebestačný, ale neschopný práce. Trávi viac ako 50% dennej doby mimo lôžko.	50-60
3	Obmedzene sebestačný, upútaný na lôžko viac ako 50% dennej doby.	30-40
4	Plne závislý na druhej osobe. Trvale upútaný na lôžko.	20-30
-	Moribundný.	0-20

Lokálne vyšetrenie miesta bolesti :

Miera utrpenia :

Potreba ďalších konziliárnych vyšetrení :

Diagnostický záver bolesti :

Kód bolesti podľa IASP:

I. oblasť	II. systém	III. charakteristika bolesti	IV. trvanie bolesti	V. etiológia	
Hlava, tvár, ústa	000. nervový systém a zmysly	00. nezistená, neznáma	0. nezistené, neznáme	.0 genetické a vrodené chyby	.00
krk	100. nervový systém (psychiatr.)	10. 1 záchvat, limitované trvanie	1. slabá (0-3) ≤1 mes.	.1 trauma, operácia, úraz	.01
rameno, HK	200. respiračný, kardiovask.	20. trvalá rovnakej intenzity	2. slabá (0-3) 1-6 mes.	.2 infekcia, parazity	.02
hrudník	300. kostra, svaly, spojivo	30. trvalá menlivej intenzity	3. slabá (0-3) 6 mes. ≤	.3 zápalové, imunitné reakcie	.03
brucho	400. koža, podkožie, žľazy	40. opakovaná nepravidelne	4. stredná (4-7) ≤1 mes.	.4 neoplazma	.04
LS, krčnica a kostrč	500. gastro-intestinálny	50. opakovaná pravidelne	5. stredná (4-7) 1-6 mes.	.5 toxická, metabolická, cievna, výživová, endokrinná, radiačná	.05
dolné končatiny	600. pohlavno-močový	60. záchvatovitá	6. stredná (4-7) 6 mes. ≤	.6 degeneratívna, mechanická	.06
panva	700. ostatné (ŠŽ, LU, hemopoet.)	70. trvalá so silnými záchvatmi	7. slabá (0-3) ≤1 mes.	.7 dysfunkčná	.07
perineum a genitál	800. viac ako 1 systém	80. iná kombinácia	8. silná (8-10) 1-6 mes.	.8 neznáma a iná	.08
viac ako 3 časti	900.	. žiadna z uvedených	9. silná (8-10) 6 mes. ≤	.9 psychologické príčiny	.09

Prognóza : dobrá: neurčitá : zlá :

Návrh liečby bolesti :

Kontrolné algeziologické vyšetrenie u pacienta s nádorovou bolesťou:

Priebežné hodnotenie intenzity, úľavy bolesti: GSB - globálne skóre bolesti

Zmeny intenzity bolesti vo VAS	Zvýšená 2	Rovnaká 1	Znížená 0		
Verbálna stupnica	Neznesiteľná 4	Silná 3	Stredná 2	Slabá 1	Žiadna 0
Percentá úľavy bolesti	0-30% 4	30-<50% 3	50-<80% 2	80-<100% 1	100% 0

Globálne skóre bolesti (rozpätie 0-10) je vypočítanou sumou zo zmien vo VAS, verbálnej stupnice a percentuálneho vyjadrenia úľavy bolesti.